Apellidos		
Nombre	DNI	
Asignatura Física cuántica I	Grupo	
Curso 2º	Fecha	

Física cuántica I - Grupos B, B2 y E

Examen final – 12 de septiembre de 2017

Soluciones

Problema 1 (1+1+1 puntos).

Una partícula tiene función de ondas en un instante t_0

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ \sqrt{x} e^{-x^2/4a^2} & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

con $a > 0$ una constante con dimensiones de longitud. Normalícese la función de ondas.

$$\psi_{\text{normalizada}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{1}{a} \sqrt{x} e^{-x^2/4a^2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

¿Cuál es la probabilidad de encontrar la partícula entre 0 y a ?

$$\text{Prob}(0, a) = 1 - \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0.393$$

Calcúlense el valor esperado de x^2 .

$$\langle x^2 \rangle = 2a^2$$

(Operaciones al final)

Problema 2 (1 punto). Una partícula con energía $E = \hbar^2 k^2 / 2m$ incide desde la izquierda en forma de onda plana sobre el potencial de la figura. Se sabe que $V_0 < E < V_1$.

Escríbase la función de ondas en las distintas zonas. No se pide imponer las condiciones de pegado sobre la función de ondas y determinar las constantes de integración, sólo el tipo de solución permitida en cada zona.

$$\phi_{\text{I}}(x) = A e^{ik_1 x} + B e^{-ik_1 x} \qquad k_1 = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}$$

$$\phi_{\text{II}}(x) = C e^{k_2 x} + D e^{-k_2 x} \qquad k_2 = \frac{\sqrt{2m(V_1 - E)}}{\hbar}$$

$$\phi_{\text{III}}(x) = E e^{ik_3 x} + F e^{-ik_3 x} \qquad k_3 = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = k$$

$$\phi_{\text{IV}}(x) = 0$$

Nombre

Problema 3 (0.4 × 5 = 2 puntos).

Un átomo de hidrógeno se encuentra en un instante en un estado con función de ondas

$$\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{15}} \psi_{100} + \frac{1}{\sqrt{5}} \psi_{21-1} - \frac{i}{\sqrt{5}} \psi_{210} + \frac{1}{\sqrt{5}} \psi_{32-1} + \frac{1+i}{\sqrt{6}} \psi_{311}.$$

(1) ¿Cuál es probabilidad de obtener E_1 al medir la energía?

$$\text{Prob}(E_1) = \left| \frac{1}{\sqrt{15}} \right|^2 = \frac{1}{15}$$

(2) ¿Cuál es probabilidad de obtener E_2 al medir la energía?

$$\text{Prob}(E_2) = \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 + \left| \frac{-i}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{2}{5}$$

(3) ¿Cuál es la probabilidad de obtener $\hbar$ al medir la tercera componente del momento angular?

$$\text{Prob}(\hbar) = \left| \frac{1+i}{\sqrt{6}} \right|^2 = \frac{1}{3}$$

(4) ¿Cuál es el valor esperado de la tercera componente L_z del momento angular?

$$\langle L_z \rangle = 0 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 (-\hbar) + 0 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 (-\hbar) + \left| \frac{1+i}{6} \right|^2 \hbar = -\frac{1}{15} \hbar$$

(5) ¿Cuál es el valor esperado del cuadrado $\mathbf{L}^2$ del momento angular?

$$\langle \mathbf{L}^2 \rangle = 0 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 2\hbar^2 + \left| \frac{-i}{\sqrt{5}} \right|^2 2\hbar^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 6\hbar^2 + \left| \frac{1+i}{6} \right|^2 2\hbar^2 = \frac{8}{3} \hbar^2$$

Lo primero que hay que hacer es comprobar si la función de ondas dada está normalizada. La suma de los módulos de los coeficientes al cuadrado es

$$\left| \frac{1}{\sqrt{15}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 + \left| \frac{-i}{\sqrt{5}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 + \left| \frac{1+i}{6} \right|^2 = \frac{1}{15} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} = 1.$$

Como ψ está normalizada, las probabilidades son (las sumas de) los módulos de los coeficientes al cuadrado que se dan arriba.

Problema 4 (1+1 puntos).

Un átomo de hidrógeno se encuentra en un estado con función de ondas normalizada

$$\psi_{321}(x, t) = e^{-iE_3t/\hbar} \frac{1}{81\sqrt{\pi}a_0^3} \left(\frac{r}{a_0}\right)^2 e^{-r/3a_0} \sin\theta \cos\theta e^{i\phi},$$

donde a_0 es el radio de Bohr. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia del núcleo comprendida entre r y $r + dr$?

$$\text{Prob}_{321}(r, r + dr) = \frac{8}{98415 a_0^7} r^6 e^{-2r/3a_0} dr =: P(r) dr$$

¿A qué distancia r es máxima dicha probabilidad? **En este apartado es necesario entregar los cálculos.**

$$r_{\text{máx}} = 9a_0$$

- $\text{Prob}_{321}(r, r + dr)$ está dada por

$$\begin{aligned} \text{Prob}_{321}(r, r + dr) &= \int_0^\pi d\theta \sin\theta \int_0^{2\pi} d\phi r^2 dr |\psi_{321}|^2 \\ &= r^2 dr \frac{r^4 e^{-2r/3a_0}}{3^8 \pi a_0^7} \int_0^\pi d\theta \sin^3\theta \cos^2\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \text{escribiendo } \sin^3\theta = (1 - \cos^2\theta) \sin\theta \text{ las integrales angulares dan } \frac{8\pi}{15} \\ &= \frac{8}{98415 a_0^5} r^6 e^{-2r/3a_0} dr =: P(r) dr \end{aligned}$$

- $\text{Prob}_{321}(r, r + dr)$ alcanza su máximo en

$$P'(r) = 0 \Leftrightarrow e^{-2r/3a_0} \left(6r^5 - \frac{2r^6}{3a_0}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} r \rightarrow \infty & \text{mínimo} \\ r = 0 & \text{mínimo} \\ r = 9a_0 & \text{máximo} \end{cases}$$

Nombre -----

Problema 5 (1+1 puntos). En este problema es necesario entregar los cálculos.

Una partícula de masa m se mueve en un pozo infinito unidimensional de anchura a centrado en $x = 0$. En un tiempo t_0 su estado está descrito por la función de ondas normalizada

$$\psi(x, t_0) = \sqrt{\frac{30}{a^5}} \left(\frac{a^2}{4} - x^2 \right).$$

¿Cuál es la probabilidad de que al medir la energía se obtengan las autoenergías E_1 y E_2 del pozo?

$$\text{Prob}(E_1) = \frac{960}{\pi^6}$$

$$\text{Prob}(E_2) = 0$$

La probabilidad de obtener una autoenergía E_n es el módulo al cuadrado del coeficiente c_n del desarrollo de Fourier de ψ en la base $\{\phi_n\}$ de autoestados del pozo infinito. Es decir,

$$\text{Prob}(E_n) = |c_n|^2, \quad \text{con } c_n = \int_{-a/2}^{a/2} dx \phi_n^*(x) \psi(x, t_0).$$

Como $\psi(x, t_0)$ es par, $\phi_2 = \sqrt{2/a} \sin(2\pi/x)$ es impar y el intervalo de integración es simétrico (con respecto al origen) se tiene que

$$\text{Prob}(E_2) = 0.$$

Pasemos a calcular $\text{Prob}(E_1)$:

$$\begin{aligned} \text{Prob}(E_1) &= \int_{-a/2}^{a/2} dx \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sqrt{\frac{30}{a^5}} \left(\frac{a^2}{4} - x^2\right) \\ &= \frac{2\sqrt{15}}{a^3} \left[\frac{a^2}{4} \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) - \int_{-a/2}^{a/2} dx x^2 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right]. \end{aligned}$$

La primera integral es trivial,

$$\frac{a^2}{4} \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) = \frac{a^3}{2\pi}.$$

Nombre

La segunda se hace integrando dos veces por partes:

$$\begin{aligned} \int_{-a/2}^{a/2} dx x^2 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) &= \left\{ \begin{array}{l} u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx \\ dv = \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \Rightarrow v = \frac{a}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \end{array} \right\} \\ &= \frac{ax^2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \Big|_{-a/2}^{a/2} - \frac{2a}{\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx x \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ &= \frac{a^3}{2\pi} - \frac{2a}{\pi} \left\{ \begin{array}{l} u = x \Rightarrow du = dx \\ dv = \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \Rightarrow v = -\frac{a}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \end{array} \right\} \\ &= \frac{a^3}{2\pi} - \frac{2a}{\pi} \left[-\frac{ax}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \Big|_{-a/2}^{a/2} + \frac{a}{\pi} \int_{-a/2}^{a/2} dx \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] \\ &= \frac{a^3}{2\pi} - \frac{2a}{\pi} \left[0 + \frac{2a^2}{\pi^2} \right]. \end{aligned}$$

Poniendo todo junto se tiene

$$\text{Prob}(E_1) = \left| \frac{8\sqrt{15}}{\pi^3} \right|^2.$$

Cálculos del problema 1.

- La condición de normalización para la función de ondas normalizada $\psi_{\text{nor}} = N\psi$ es

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_{\text{nor}}(x)|^2 = |N|^2 \int_0^{\infty} dx \left| \sqrt{x} e^{-x^2/4a^2} \right|^2 = |N|^2 \int_0^{\infty} dx x e^{-x^2/2a^2} = |N|^2 a^a.$$

Basta tomar, por ejemplo, $N = 1/a$.

- $\text{Prob}(0, a) = \int_0^a dx |\psi_{\text{nor}}(x)|^2 = \frac{1}{a^2} \int_0^a dx x e^{-x^2/2a^2} = -e^{-x^2/2a^2} \Big|_0^a = 1 - \frac{1}{\sqrt{e}} \approx 0.393.$
- $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 |\psi_{\text{nor}}(x)|^2 = \frac{1}{a^2} \int_0^{\infty} dx x^3 e^{-x^2/2a^2} = 2a^2.$