

EDPs de primer orden

$$\boxed{A(x, y) u_y + B(x, y) u_x = H(x, y) u + F(x, y)} \rightarrow \text{características } \xi(x, y) = K.$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = y \end{cases} \rightarrow A u_\eta = H u + F ; \quad \begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = x \end{cases} \rightarrow B u_\eta = H u + F.$$

EDPs de 2º orden

$$\boxed{A u_{yy} + B u_{xy} + C u_{xx} + D u_y + E u_x + H u = F} \rightarrow \begin{cases} \xi = px + qy \\ \eta = rx + sy \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{yy} = q^2 u_{\xi\xi} + 2qs u_{\xi\eta} + s^2 u_{\eta\eta} \\ u_{xy} = pq u_{\xi\xi} + (ps+qr) u_{\xi\eta} + rs u_{\eta\eta} \\ u_{xx} = p^2 u_{\xi\xi} + 2pr u_{\xi\eta} + r^2 u_{\eta\eta} \end{cases}$$

Hiperbólicas ($B^2 - 4AC > 0$)

$$\begin{cases} \xi = x - \frac{B - \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} y \\ \eta = x - \frac{B + \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} y \end{cases} \rightarrow \boxed{u_{\xi\eta} + \dots = F^*}$$

Parabólicas ($B^2 - 4AC = 0$)

$$\begin{cases} \xi = x - \frac{B}{2A} y \\ \eta = y \end{cases} \rightarrow \boxed{u_{\eta\eta} + \dots = F^*}$$

Elípticas ($B^2 - 4AC < 0$)

$$\begin{cases} \xi = \frac{2Ax - By}{\sqrt{4AC - B^2}} \\ \eta = y \end{cases} \rightarrow \boxed{u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} + \dots = F^*}$$

Formas canónicas resolubles: $\boxed{u_{\eta\eta} + E^* u_\eta + H^* u = F^*}$, $\boxed{u_{\xi\xi} + D^* u_\xi = F^*}$, $\boxed{u_{\xi\eta} + E^* u_\eta = F^*}$.

Separación de variables para calor

Tienen solución única $\begin{cases} u_t - k u_{xx} = F(x, t), x \in (0, L), t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), \text{ c. contorno físicas} \end{cases}$

$$\begin{cases} u(0, t) = h_0(t) ; & u_x(0, t) = h_0(t) ; & u(0, t) - a u_x(0, t) = h_0(t) \\ u(L, t) = h_L(t) ; & u_x(L, t) = h_L(t) ; & u(L, t) + b u_x(L, t) = h_L(t) \end{cases}, a, b > 0$$

[temperaturas o flujo dados o radiación libre]

Separando variables en la homogénea: $u_t - k u_{xx} = 0, u = XT \rightarrow X'' + \lambda X = 0, T' + \lambda k T = 0.$

En problemas no homogéneos se prueban series de autofunciones del homogéneo, con $T_n(t)$ que se determinan llevando la serie a la ecuación con F desarrollada y usando el dato inicial.

Si las condiciones de contorno no son homogéneas hay que hacer un cambio de variable $w = u - v.$

En particular $v(x, t) = [1 - \frac{x}{L}] h_0(t) + \frac{x}{L} h_L(t)$ satisface $v(0, t) = h_0(t), v(L, t) = h_L(t).$

Ecuación de ondas

La solución única de $\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = F(x, t), x, t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = f(x), u_t(x, 0) = g(x) \end{cases}$ es:

$$\boxed{u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x+ct) + f(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds + \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} F(s, \tau) ds d\tau}$$

Si $F=0, \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c}\int_0^x g$ viaja hacia la derecha y $\frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c}\int_0^x g$ hacia la izquierda.

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = F, x \geq 0, t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = f, u_t(x, 0) = g \end{cases}, \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = F, x \in [0, L], t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = f, u_t(x, 0) = g \\ u(0, t) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = F^*(x, t), x, t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = f^*(x), u_t(x, 0) = g^*(x) \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \end{cases}$$

f^*, g^*, F^* extensiones impares de $f(x), g(x), F(x, t)$ respecto a $x=0$ ó a $x=0$ y $x=L.$

Separando variables: $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, u = XT \rightarrow X'' + \lambda X = 0, T'' + \lambda c^2 T = 0.$

Separación de variables para Laplace

$$\begin{cases} \Delta u = F \text{ en } D \\ u = f \text{ en } \partial D \end{cases} \text{ solución única. Unicidad salvo constante } \begin{cases} \Delta u = F \text{ en } D \\ u_n = f \text{ en } \partial D \end{cases} \text{ si } \iint_D F dx dy = \oint_{\partial D} f ds.$$

Separando variables en cartesianas: $u_{xx} + u_{yy} = 0, u = XY \rightarrow X'' \pm \lambda X = 0, Y'' \mp \lambda Y = 0.$

En polares: $u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0, u = R\Theta \rightarrow \Theta'' + \lambda\Theta = 0, r^2 R'' + rR' - \lambda R = 0.$

En círculos y coronas se exige periodicidad. Si el recinto incluye el origen, acotación de la $R.$

En particular, en un **círculo** $r < R$ es: $\lambda_n = n^2, \Theta_n = \{\cos n\theta, \sin n\theta\}, R_n = \{r^n\}, n=0, 1, \dots$

Cálculo diferencial en \mathbf{R}^n

$\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n: \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \phi, \|\mathbf{a}\| = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})^{1/2}, \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$

Segmento que une \mathbf{a} y $\mathbf{b}: \mathbf{x} = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), t \in [0, 1].$

$B_r(\mathbf{a}) \equiv \{\mathbf{x}: \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < r\}.$ $\mathbf{a} \in \text{int} A \subset \mathbf{R}^n$ si existe $B_r(\mathbf{a}) \subset A. \partial A \equiv \{\mathbf{x}: \forall r, B_r(\mathbf{x}) \text{ tiene puntos de } A \text{ y de } \mathbf{R}^n - A\}.$

Campo escalar $f: D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}.$ Gradiente $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})$ [perpendicular a $f(x) = C$].

$f \in C^n$ en A si sus derivadas parciales de orden n son continuas en todo $\mathbf{x} \in A. f \in C^2 \Rightarrow f_{xy} = f_{yx}.$

Derivada de $f \in C^1$ en $\mathbf{a} \in \text{int} D$ según $\mathbf{v}: D_v f(\mathbf{a}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{a} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{a})}{h} = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$ [direccional, si $\|\mathbf{v}\| = 1$].

$f \in C^1$ en un entorno de $\mathbf{a} \Rightarrow f$ diferenciable en \mathbf{a} (tiene plano tangente) $\Rightarrow f$ continua en $\mathbf{a}.$

Plano tangente a la gráfica de $z = f(x, y)$ en $(a, b): z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b).$

Plano tangente a S en $(a, b, c) \in S$ dada por $F(x, y, z) = K: \nabla F(a, b, c) \cdot (x - a, y - b, z - c) = 0.$

Función vectorial $\mathbf{c}(t) = (c_1(t), \dots, c_n(t)): \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^n. \mathbf{c}'(t) = (c_1'(t), \dots, c_n'(t)).$ Recta tangente: $\mathbf{x} = \mathbf{c}(t_0) + \mathbf{sc}'(t_0).$

Campo vectorial $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_m): D \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^m.$ Matriz diferencial o jacobiana de $\mathbf{f}: \mathbf{Df}(\mathbf{x}) \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$

Regla de la cadena: $\mathbf{R}^p \xrightarrow{\mathbf{g}} \mathbf{R}^n \xrightarrow{\mathbf{f}} \mathbf{R}^m, \mathbf{g}$ diferenciable en \mathbf{a}, \mathbf{f} diferenciable en $\mathbf{b} = \mathbf{g}(\mathbf{a}) \Rightarrow \mathbf{D}(\mathbf{f} \circ \mathbf{g})(\mathbf{a}) = \mathbf{Df}(\mathbf{b}) \mathbf{Dg}(\mathbf{a}).$

[En particular: $\mathbf{f}(\mathbf{c}(t)) \rightarrow \frac{d\mathbf{f}}{dt} = \nabla \mathbf{f}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}, f(x(r, s), y(r, s)) \rightarrow \begin{matrix} f_r = f_x x_r + f_y y_r \\ f_s = f_x x_s + f_y y_s \end{matrix}.$

$$\text{div } \mathbf{f} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial f_n}{\partial x_n}, \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}, \text{rot } \mathbf{f} = \nabla \times \mathbf{f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f & g & h \end{vmatrix} = (h_y - g_z, f_z - h_x, g_x - f_y).$$

Si $n=2: \mathbf{f} = (f, g), \text{div } \mathbf{f} = f_x + g_y, \Delta f = f_{xx} + f_{yy} = f_{rr} + \frac{1}{r} f_r + \frac{1}{r^2} f_{\theta\theta}.$ rot $(\nabla \times \mathbf{f}) = 0, \text{div}(\nabla \times \mathbf{f}) = 0.$

Cálculo integral en \mathbf{R}^n

Integrales dobles: f continua en $R = [a, b] \times [c, d] \Rightarrow \iint_R f = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$

c, d continuas en $[a, b], f$ continua en $D = \{(x, y): a \leq x \leq b, c(x) \leq y \leq d(x)\} \Rightarrow \iint_D f = \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} f dy dx$

a, b continuas en $[c, d], f$ continua en $D = \{(x, y): c \leq y \leq b, a(y) \leq x \leq b(y)\} \Rightarrow \iint_D f = \int_c^d \int_{a(y)}^{b(y)} f dx dy$

Área de $D: A = \iint_D dx dy.$ Volumen bajo $f(x, y) \geq 0$ en $D: V = \iint_D f dx dy.$

Cambios de variable: $\mathbf{g}: (u, v) \rightarrow (x(u, v), y(u, v))$ de C^1 , inyectiva en $D^*, \mathbf{g}(D^*) = D$ y f integrable. Entonces:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv, \text{ con } \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} \text{ [determinante jacobiano].}$$

En particular: $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} r f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr d\theta.$

Integrales triples: f continua en $B = [a, b] \times [c, d] \times [p, q] \Rightarrow \iiint_B f = \int_p^q \int_c^d \int_a^b f(x, y, z) dx dy dz$ (o las otras 5)

$$V = \{(x, y, z): a \leq x \leq b, c \leq y \leq d(x), p(x, y) \leq z \leq q(x, y)\} \Rightarrow \iiint_V f = \int_a^b \int_{c(x)}^{d(x)} \int_{p(x, y)}^{q(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx.$$

Volumen de $V = \iiint_V dx dy dz.$ Masa de $V: M = \iiint_V D(x, y, z) dx dy dz, D(x, y, z)$ densidad.

Cambios: $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw.$

$$\begin{matrix} \text{Cilíndricas:} & \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} & \begin{cases} r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi \\ \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} \right| = r \end{cases} \\ \text{Esféricas:} & \begin{cases} x = \rho \sin \theta \cos \phi \\ y = \rho \sin \theta \sin \phi \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} & \begin{cases} \rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi < 2\pi \\ \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} \right| = \rho^2 \sin \theta \end{cases} \end{matrix}$$

Integrales de línea: $\mathbf{c}(t): [a, b] \rightarrow \mathbf{R}^n, C^1$ a trozos, describiendo curva $C. L = \int_a^b \|\mathbf{c}'(t)\| dt$ longitud de $C.$

f campo escalar: $\int_C f ds \equiv \int_a^b f(\mathbf{c}(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt$ [independiente de la parametrización].


\mathbf{f} campo vectorial: $\int_C \mathbf{f} \cdot ds = \int_a^b \mathbf{f}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt$ [salvo el signo, independiente de la parametrización].

Si $\mathbf{f} = \nabla U$ [U potencial, \mathbf{f} conservativo], $\int_C \mathbf{f} \cdot ds = U(\mathbf{c}(b)) - U(\mathbf{c}(a))$ [independiente del camino].

$(f(x, y), g(x, y))$ conservativo $\Rightarrow f_y = g_x. (f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z))$ conservativo $\Rightarrow \text{rot } \mathbf{f} = 0.$

Teor. Green: $D \subset \mathbf{R}^2, \partial D$ curva cerrada simple, $\mathbf{f} = (f, g) \in C^1(D) \Rightarrow \iint_D [g_x - f_y] dx dy = \oint_{\partial D} \mathbf{f} \cdot ds.$

Cónicas sencillas: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$, $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$.



Algunas propiedades de las funciones trigonométricas

$\text{sen } k\pi = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2} = 0$, $\text{cos } k\pi = (-1)^k$, $\text{sen} \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k+1}$.

$\text{sen} \frac{\pi}{6} = \text{cos} \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, $\text{sen} \frac{\pi}{4} = \text{cos} \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\text{sen} \frac{\pi}{3} = \text{cos} \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$\text{arctan}(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}) = \pm \frac{\pi}{6}$, $\text{arctan}(\pm 1) = \pm \frac{\pi}{4}$, $\text{arctan}(\pm \sqrt{3}) = \pm \frac{\pi}{3}$.

$\text{sen}(a \pm b) = \text{sen } a \text{cos } b \pm \text{cos } a \text{sen } b$, $\text{cos}(a \pm b) = \text{cos } a \text{cos } b \mp \text{sen } a \text{sen } b$.

$\text{sen } 2a = 2 \text{sen } a \text{cos } a$, $\text{sen}^2 a = \frac{1-\text{cos } 2a}{2}$, $\text{cos } 2a = \text{cos}^2 a - \text{sen}^2 a$, $\text{cos}^2 a = \frac{1+\text{cos } 2a}{2}$, $\text{sen}^3 a = \frac{3 \text{sen } a - \text{sen } 3a}{4}$, $\text{cos}^3 a = \frac{3 \text{cos } a + \text{cos } 3a}{4}$.

$\text{sen } a \text{sen } b = \frac{\text{cos}(a-b) - \text{cos}(a+b)}{2}$, $\text{cos } a \text{cos } b = \frac{\text{cos}(a-b) + \text{cos}(a+b)}{2}$, $\text{sen } a \text{cos } b = \frac{\text{sen}(a+b) + \text{sen}(a-b)}{2}$.


$[\text{sen } x]' = \text{cos } x$, $[\text{cos } x]' = -\text{sen } x$, $[\text{tan } x]' = 1 + \text{tan}^2 x = \frac{1}{\text{cos}^2 x}$, $[\text{arctan } x]' = \frac{1}{1+x^2}$.

Para integrar $\text{sen}^m \text{cos}^n$ con m y n pares se usan las fórmulas •.

Si alguna de las dos es impar, son casi inmediatas [tras utilizar, tal vez, que $\text{sen}^2 + \text{cos}^2 = 1$].

Las integrales $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) dx$ se convierten en trigonométricas haciendo $x = a \text{sen } u$.


Se integran por partes $\int x^n \text{sen } x dx$, $\int x^n \text{cos } x dx$, $\int x^n e^{ax} dx$, $\int x^n \ln x dx$, ...



Funciones hiperbólicas

$\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\text{th } x = \frac{\text{sh } x}{\text{ch } x}$.

$[\text{sh } x]' = \text{ch } x$, $[\text{ch } x]' = \text{sh } x$, $[\text{th } x]' = 1 - \text{th}^2 x = \frac{1}{\text{ch}^2 x}$.



Ecuaciones diferenciales ordinarias

EDOs de primer orden: $y' = f(x, y)$ [f, f_y continuas en entorno de $(a, b) \Rightarrow$ solución única con $y(a) = b$].

Algunas ecuaciones resolubles: Separables: $y' = \frac{p(x)}{q(y)} \rightarrow \int q(y) dy = \int p(x) dx + C$.

Se convierten en separables: $y' = f(\frac{y}{x})$, con $z = \frac{y}{x}$; $y' = f(ax+by)$, con $z = ax+by$.

Lineales: Homogénea $y' = a(x)y \rightarrow y = C e^{\int a(x) dx}$.

No homogénea $y' = a(x)y + f(x) \rightarrow y = C e^{\int a(x) dx} + e^{\int a(x) dx} \int e^{-\int a(x) dx} f(x) dx$ [sgh + y_p].

Exactas: $M(x, y) + N(x, y) y' = 0$ con $M = U_x$, $N = U_y$ [$M_y = N_x$] $\rightarrow U(x, y) = C$.

EDOs lineales de orden 2: [$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$], $a, b, f \in C(I)$. $|W|(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$ wronskiano.

Si $x_0 \in I$, [n] tiene una sola solución con los datos iniciales $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_0'$.

Si y_1, y_2 son soluciones de la homogénea ($f=0$) con $|W|(s) \neq 0$ para $s \in I$, la solución general de la homogénea es: $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$.

Si y_p es una solución de [n], la solución general de [n] es: $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + y_p$.

Una solución particular de [n] es: $y_p = y_2 \int \frac{y_1 f}{|W|} dx - y_1 \int \frac{y_2 f}{|W|} dx$ [fvc].

Si $b(x) \equiv 0$, $y' = v$ lleva [n] a lineal de primer orden en v .

y_1 solución de la homogénea $\Rightarrow y_2 = y_1 \int e^{-\int a dx} y_1^{-2} dx$ otra solución de la homogénea.

[Salvo en los casos conocidos las soluciones se calculan probando series de potencias en la ecuación].

Coefficientes constantes: $y'' + ay' + by = 0$ $\mu_1 \neq \mu_2$ reales $\rightarrow y = c_1 e^{\mu_1 x} + c_2 e^{\mu_2 x}$
 μ doble (real) $\rightarrow y = (c_1 + c_2 x) e^{\mu x}$
 $\mu^2 + a\mu + b = 0$ $\mu = p \pm i q \rightarrow y = (c_1 \text{cos } qx + c_2 \text{sen } qx) e^{px}$

Método de coeficientes indeterminados para hallar y_p de $y'' + ay' + by = f(x)$:

Si $f(x) = p_m(x)$, p_m polinomio de grado m , $\mu = 0$ no autovalor hay solución particular $y_p = P_m(x)$. Si $\mu = 0$ es autovalor de multiplicidad r , hay $y_p = x^r P_m(x)$.

Si $f(x) = e^{\mu x} p_m(x)$, p_m de grado m , μ no autovalor hay solución $y_p = e^{\mu x} P_m(x)$. Si μ es autovalor de multiplicidad r , hay $y_p = x^r e^{\mu x} P_m(x)$.

Si $f(x) = e^{p x} [p_j(x) \text{cos } qx + q_k(x) \text{sen } qx]$, p_j, q_k de grados j, k , $\mu = p \pm i q$ no autovalor hay $y_p = e^{p x} [P_m(x) \text{cos } qx + Q_m(x) \text{sen } qx]$ con P_m y Q_m de grado $m = \max\{j, k\}$. Si $p \pm i q$ es autovalor hay $y_p = x e^{p x} [P_m(x) \text{cos } qx + Q_m(x) \text{sen } qx]$.

Euler: $x^2 y'' + ax y' + by = 0$ $\mu_1 \neq \mu_2$ reales $\rightarrow y = c_1 x^{\mu_1} + c_2 x^{\mu_2}$
 μ doble (real) $\rightarrow y = (c_1 + c_2 \ln x) x^\mu$
 $\mu(\mu-1) + a\mu + b = 0$ $\mu = p \pm i q \rightarrow y = [c_1 \text{cos}(q \ln x) + c_2 \text{sen}(q \ln x)] x^p$

Una y_p de $x^2 y'' + ax y' + by = h(x)$ se obtiene de la [fvc] (con $f(x) = h(x)/x^2$), o utilizando que con $x = e^s$ se convierte en $y''(s) + (a-1)y'(s) + by(s) = h(e^s)$.

Problemas de contorno para EDOs y serie de Fourier

(P_s) $\begin{cases} [p y']' - q y + \lambda r y = 0 & p \in C^1, q, r \text{ continuas, } p, r > 0 \text{ en } [a, b], \\ \alpha y(a) - \alpha' y'(a) = \beta y(b) + \beta' y'(b) = 0 & |\alpha| + |\alpha'|, |\beta| + |\beta'| \neq 0. \end{cases}$

Los $\lambda_n \rightarrow \infty$. Las $\{y_n\}$ son espacio vectorial de dimensión 1 y cada y_n tiene $n-1$ ceros en (a, b) . $\langle y_n, y_m \rangle \equiv \int_a^b r y_n y_m dx = 0$, si $n \neq m$. Si $\alpha \cdot \alpha' \geq 0, \beta \cdot \beta' \geq 0$ y $q(x) \geq 0$ en $[a, b] \Rightarrow \lambda_n \geq 0$.

Para escribir $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$ en forma autoadjunta, se multiplica por $e^{\int a dx}$.

El no homogéneo (P_T) $\begin{cases} [p(x)y']' + g(x)y = f(x) & \text{tiene 1 solución cuando el homogéneo} \\ \alpha y(a) - \alpha' y'(a) = \beta y(b) + \beta' y'(b) = 0 & \text{(P}_h\text{) tiene sólo la solución } y \equiv 0. \end{cases}$

Cuando (P_h) tiene soluciones no triviales $\{y_n\}$, (P_T) tiene infinitas segun sea $\int_a^b f(x) y_n(x) dx \stackrel{?}{=} 0$.

Si f es C^1 a trozos en $[a, b]$ la serie de Fourier $\sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x)$, con $c_n = \frac{\langle f, y_n \rangle}{\langle y_n, y_n \rangle}$, converge hacia $f(x)$ en los $x \in (a, b)$ en que f es continua y en los x en que es discontinua hacia $\frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)]$.

Problemas separados conocidos para $y'' + \lambda y = 0$ (ya en forma autoadjunta, $r=1, q=0$):

	senos	cosenos	senos impares	cosenos impares
c. contorno	$y(0) = y(L) = 0$	$y'(0) = y'(L) = 0$	$y(0) = y'(L) = 0$	$y'(0) = y(L) = 0$
λ_n	$\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, n = 0, 1, 2, \dots$	$\frac{[2n-1]^2 \pi^2}{2^2 L^2}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{[2n-1]^2 \pi^2}{2^2 L^2}, n = 1, 2, \dots$
$y_n \cdot \langle y_n, y_n \rangle$	$\left\{ \text{sen} \frac{n\pi x}{L} \right\}, \frac{L}{2}$	$\left\{ \text{cos} \frac{n\pi x}{L} \right\}, L \text{ ó } \frac{L}{2}$	$\left\{ \text{sen} \frac{[2n-1]\pi x}{2L} \right\}, \frac{L}{2}$	$\left\{ \text{cos} \frac{[2n-1]\pi x}{2L} \right\}, \frac{L}{2}$

Por tanto, en estos cuatro casos es $c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) y_n(x) dx$ (poniendo $\frac{\omega}{2}$ en la serie de cosenos).

Condiciones **periódicas:** $y(-L) = y(L), y'(-L) = y'(L) \rightarrow y_n = \left\{ \text{cos} \frac{n\pi x}{L}, \text{sen} \frac{n\pi x}{L} \right\}, n = 0, 1, \dots [y_0 = \{1\}]$.

La serie en **senos y cosenos** de $f(x)$ en $[-L, L]$: $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \text{cos} \frac{n\pi x}{L} + b_n \text{sen} \frac{n\pi x}{L}]$, con $a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \text{cos} \frac{n\pi x}{L} dx, n = 0, 1, 2, \dots, b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \text{sen} \frac{n\pi x}{L} dx, n = 1, 2, \dots$, converge a $f(x)$ en los x en que su extensión $2L$ -periódica es continua (y en los otros x hacia $\frac{1}{2} [f(x^-) + f(x^+)]$). La serie en **senos cosenos** converge hacia la extensión **impar par** y $2L$ -periódica de la f .