Soluciones de los problemas 1, 2, 3 y 4 de MétodosII-C (entregados el 14-2-25).

- 1.** Sea [E] $yu_y - xu_x = -u + x^2y^2$. **a)** Hallar su solución general, tomando i) $\eta = x$ y ii) $\eta = y$, y la que cumple $u(x, -1) = x$, dibujando las características y probando que es única.
b) Escribir, si las hay, 2 soluciones distintas de [E] que satisfagan $u(x, 0) = x$.
c) Precisar en qué puntos del plano puede dar problemas de unicidad el dato $u(x, 2x - 2) = 0$.

a) $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \xrightarrow{\text{lineal}} y = \frac{C}{x}$ (siempre peor vista como separable), $xy = C$ características.

i) $\begin{cases} \xi = xy \\ \eta = x \end{cases}, \begin{cases} u_y = xu_\xi \\ u_x = yu_\xi + u_\eta \end{cases} \rightarrow \eta u_\eta = u - \xi^2, u = p(\xi)\eta + \xi^2, u(x, y) = p(xy)x + x^2y^2$.
 $e^{\int d\eta/\eta} = \eta, u_p$ a ojo

ii) $\begin{cases} \xi = xy \\ \eta = y \end{cases}, \begin{cases} u_y = yu_\xi + u_\eta \\ u_x = xu_\xi \end{cases} \rightarrow \eta u_\eta = -u + \xi^2, u = \frac{q(\xi)}{\eta} + \xi^2, u(x, y) = \frac{q(xy)}{y} + x^2y^2$.

$u(x, -1) = x^2 + xp(-x) = x, p(-x) = 1 - x, p(v) = 1 + v, u(x, y) = x + x^2y + x^2y^2$.

O bien $u(x, -1) = x^2 - q(-x) = x, q(-x) = x^2 - x, q(v) = v + v^2$.

Es única porque la recta $y = -1$ no es tangente a ninguna característica.
 O porque $T(x) = 1 \cdot (-1) - 0 \cdot (-x) = -1 \neq 0$ para todo x . O porque en el proceso de cálculo ha quedado $p(v)$ determinada $\forall v$ de forma única.

b) $u(x, 0) = 0 + xp(0) = x$ se cumple $\forall p \in C^1$ con $p(0) = 1$, y posee infinitas soluciones (peor usando la q).

Por ejemplo, $p(v) \equiv 1, p(v) = v + 1$ dan lugar a las dos soluciones $u_1 = x + x^2y^2, u_2 = x + x^2y + x^2y^2$.

[$T(x) = 1 \cdot 0 - 0 \cdot (-x) \equiv 0$ corrobora que $y = 0$ era una característica, lo que era evidente.
 Esto no implica, en principio, que haya infinitas soluciones, pues podría no haber ninguna].

c) Para $(x, 2x - 2)$ es $T(x) = 1 \cdot (2x - 2) + 2 \cdot x = 4x - 2$. Es tangente a características para $x = \frac{1}{2}$ [a $xy = -\frac{1}{2}$].

Puede haber problemas de unicidad en el punto del plano $(\frac{1}{2}, -1)$.

[Los hay: $u(x, 2x - 2) = p(2x^2 - 2x)x + 4x^2(x - 1)^2$ sólo determina $p(v)$ para $v \geq -\frac{1}{2}$, valor mínimo de $2x^2 - 2x$ (en gris su gráfica). Si $v < -\frac{1}{2}$ quedan libres los valores de la $p \in C^1$, y hay infinitas soluciones cerca del punto en la zona $y < -\frac{1}{2x}$].

- 2.** $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, x \geq 0, t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \begin{cases} \cos \frac{x}{2}, x \in [\pi, 3\pi] \\ 0, \text{resto de } [0, \infty) \end{cases} \\ u(0, t) = 0 \end{cases}$ **a)** Dibujar la extensión g^* y dar su expresión.
b) Hallar el valor de $u(7\pi, 5\pi), u(5\pi, 5\pi), u(3\pi, 5\pi)$ y $u(\pi, 5\pi)$.
c) Calcular $u(x, 5\pi)$ para $x \geq 8\pi$ y para $6\pi \leq x \leq 8\pi$.
d) Dibujar aproximadamente $u(x, 5\pi)$ [con algún cálculo más o usando las ondas viajeras $\pm \frac{1}{2} \int_0^x g^*$].

a) La extensión impar de g es $g^*(x) = \begin{cases} -\cos \frac{x}{2} & \text{si } x \in [-3\pi, -\pi] \\ \cos \frac{x}{2} & \text{si } x \in [\pi, 3\pi] \\ 0 & \text{en el resto de } \mathbf{R} \end{cases}$

La gráfica de $\cos \frac{x}{2}$ es simplemente la del $\cos x$ expandida $\leftrightarrow$

Entonces $u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g^*(s) ds$ será la solución del problema.

b) $u(7\pi, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{12\pi} g^* = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{3\pi} \cos \frac{s}{2} ds = [\sin \frac{s}{2}]_{2\pi}^{3\pi} = \boxed{-1}$. $u(5\pi, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_0^{10\pi} g^* = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{4\pi} \cos \frac{s}{2} ds = \boxed{-2}$.

$u(3\pi, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_{-2\pi}^{8\pi} g^* = -\frac{1}{2} \int_{-2\pi}^{-\pi} g^* + \frac{1}{2} \int_{\pi}^{3\pi} g^* = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{3\pi} \cos \frac{s}{2} ds = \boxed{-1}$, como el primer valor.

$u(\pi, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_{-4\pi}^{6\pi} g^* = \boxed{0}$, pues se cancelan las integrales.

c) Para $x \geq 8\pi$ es $u(x, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_{x-5\pi}^{x+5\pi} g^* = \boxed{0}$, pues el integrando es 0 en todo el intervalo [$x - 5\pi \geq 3\pi$].

Si $6\pi \leq x \leq 8\pi, u(x, 5\pi) = \frac{1}{2} \int_{x-5\pi}^{3\pi} \cos \frac{s}{2} ds = \text{sen}(\frac{5\pi}{2} - \frac{x}{2}) - 1 = \boxed{\cos \frac{x}{2} - 1}$, pues es $\pi \leq x - 5\pi \leq 3\pi, x + 5\pi > 3\pi$.
 $\text{sen}(a-b) = \text{sen} a \cos b - \cos a \text{sen} b$

d) Hallando los valores en otros intervalos se comprueba que la forma de la solución para $t = 5\pi$ es la del dibujo de la derecha; esa es la onda que seguirá viajando a velocidad 1 hacia la derecha indefinidamente.

Otro modo de dar el dibujo (y la forma de la cuerda para otros valores de t) es dibujar las ondas viajeras $G(x) = \frac{1}{2} \int_0^x g^*$ y $-G$, trasladarlas y sumarlas.

Se pueden dibujar estas ondas sin siquiera hacer integrales, mirando las áreas positivas y negativas que se van añadiendo y utilizando el hecho de que la primitiva de una función impar es par. Trasladando la azul G a la izquierda 5π y $-G$ (verde) a la derecha es clara la suma y dónde es nula. La G , primitiva de función continua, ha de ser C^1 , como la solución.

3. Sea $\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} + u_t + 2u_x = 0 \\ u(x,0) = 2f(x), u_t(x,0) = -f(x) \end{cases}$. **a]** Resolverlo para una f general utilizando la $\mathcal{F}$. **b]** Resolverlo si $f(x) = e^x$ a partir de la forma canónica, comprobar la solución y que la proporciona la expresión hallada en **a]**. **c]** En caso de ser $f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \in [0,1] \\ 0, & \text{resto de } \mathbf{R} \end{cases}$, i) dibujar aproximadamente $u(x,1)$, ii) calcular $u(2,t) \forall t \geq 0$.

a] $\begin{cases} \hat{u}_{tt} + u_t + 4k^2\hat{u} - 2ik\hat{u} = 0 \\ \hat{u}(k,0) = 2\hat{f}(k), \hat{u}_t(k,0) = -\hat{f}(k) \end{cases}$, $\mu^2 + \mu + 4k^2 - 2ik = 0$, $\mu = \frac{-1 \pm (1+4ik)}{2} = 2ik, -2ik-1$, $\hat{u} = p(k)e^{2ikt} + q(k)e^{-2ikt-t}$
 $\xrightarrow{\text{c.i.}} p(k) + q(k) = 2\hat{f}(k), p = 2\hat{f} - q \rightarrow p(k) = \frac{\hat{f}(k)}{3ik}, q(k) = \hat{f}(k) = p(k)$, $\hat{u}(k,t) = \hat{f}(k)e^{2ikt} + e^{-t}\hat{f}(k)e^{-2ikt}$.
 $(\bullet) \boxed{u(x,t) = f(x-2t) + f(x+2t)e^{-t}}$.

b] Los términos de orden 2 son los de las ondas y ya sabemos que es hiperbólica y sus características:
 $\begin{cases} \xi = x+2t \\ \eta = x-2t \end{cases}$, $\begin{cases} u_x = u_\xi + u_\eta \\ u_t = 2u_\xi - 2u_\eta \end{cases}$, $\begin{cases} u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\xi} \\ u_{tt} = 4u_{\xi\xi} - 8u_{\xi\eta} + 4u_{\eta\xi} \end{cases} \rightarrow -16u_{\xi\eta} + 4u_\xi = 0 \xrightarrow{u_\xi=v} v_\eta = \frac{v}{4}, v = p^*(\xi)e^{\eta/4} \rightarrow$
 $u = p(\xi)e^{\eta/4} + q(\eta)$, $\boxed{u(x,t) = p(x+2t)e^{(x-2t)/4} + q(x-2t)}$ (solución general).

$\begin{cases} u(x,0) = p(x)e^{x/4} + q(x) = 2e^x, q' = 2e^x - [p' + \frac{p}{4}]e^{x/4} \\ u_t(x,0) = [2p'(x) - \frac{1}{2}p(x)]e^{x/4} - 2q'(x) = -e^x, 4p'e^{x/4} = 3e^x, p' = \frac{3}{4}e^{3x/4}, p(x) = e^{3x/4} \end{cases} \rightarrow \boxed{u(x,t) = e^{x+t} + e^{x-2t}}$.

[La solución debía ser única por que los datos se dan sobre recta no característica].

Comprobando: $u_{tt} - 4u_{xx} + u_t + 2u_x = e^{x+t}(1-4+1+2) + e^{x-2t}(4-4-2+2) = 0$, $u(x,0) = e^x + e^x$, $u_t(x,0) = e^x - 2e^x$.

En particular, para $f(x) = e^x$ nos devuelve $(\bullet)$ la solución de arriba $u = e^{x-2t} + e^{x+2t}e^{-t} = \boxed{e^{x-2t} + e^{x+t}}$.

Con algo de vista se podría dar la solución $(\bullet)$ para f cualquiera hallada en **a]**:

$\begin{cases} p(x)e^{x/4} + q(x) = 2f(x), q' = 2f' - [p' + \frac{p}{4}]e^{x/4} \\ [2p'(x) - \frac{1}{2}p(x)]e^{x/4} - 2q'(x) = -f(x), 4p'e^{x/4} = 4f' - f, p' = [f' - \frac{f}{4}]e^{-x/4} = [f e^{-x/4}]' \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} q(x) = f(x)^\dagger \\ p(x) = f(x)e^{-x/4} \end{matrix}$

- c]** i) $u(x,1) = f(x-2) + f(x+2)e^{-1}$. Es la f inicial 2 a la derecha y 2 a la izquierda, pero ésta de altura máxima $\frac{1}{4e} \approx 0.09$.

- ii) $u(2,t) = f(2-2t) + f(2+2t)e^{-t}$. Es $f(2+2t) = 0$ si $t \geq 0$ y será $f(2-2t) = 0$ si $t \in [0, \frac{1}{2}]$ o si $t \geq 1$. Es no nula sólo si $\frac{1}{2} < t < 1$ y en ese intervalo será $u(2,t) = 2(1-t)(2t-1)$.

4. **a]** Para $\begin{cases} t u_t + u_x = f(x) \\ u(x,1) = 0 \end{cases}$ i) Resolverlo con la $\mathcal{F}$, deducir la solución para $f(x) = e^x$ y comprobarla. ii) Resolver a partir de las características y probar la unicidad.
b] Ahora $\begin{cases} u_t - u_{xx} + u = 0, x \in \mathbf{R}, t > 0 \\ u(x,0) = f(x), u \text{ acotada} \end{cases}$ Hallar su solución con la $\mathcal{F}$ en términos de una integral real. Escribir la solución sin integrales en caso de que sea $f(x) = e^{-x^2/4}$.

a] i) $\begin{cases} t\hat{u}_t - i k \hat{u} = \hat{f}(k) \\ \hat{u}(k,1) = 0 \end{cases} \rightarrow \hat{u}(k,t) = p(k)e^{ik \ln t} - \frac{1}{ik} \hat{f}(k) \xrightarrow{\text{c.i.}} p(k) = \frac{1}{ik} \hat{f}(k), \hat{u}(k,t) = \hat{f}(k) \frac{e^{ik \ln t} - 1}{ik \sqrt{2\pi}}$.

El cociente es la transformada de la función $h(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } t \in [0, \ln t] \\ 0, & \text{resto de } \mathbf{R} \end{cases}$, con lo que será $u = \sqrt{2\pi} f(x) * h(x)$:

$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-s)h(s) ds = \int_0^{\ln t} f(x-s) ds \stackrel{x-s=v}{=} \int_x^{x-\ln t} f(v) dv$, $\boxed{u(x,t) = \int_{x-\ln t}^x f(v) dv}$.

Cuando $f(x) = e^x$ la solución pasa a ser $\boxed{u(x,t) = e^x(1 - \frac{1}{t})}$. $\frac{1}{t}e^x + e^x(1 - \frac{1}{t}) = e^x$ y $u(x,1) = 0$.

ii) $\frac{dt}{dx} = t, t = Ce^x$. $\boxed{te^{-x} = C}$ características. Mejor: $\begin{cases} \xi = te^{-x} \\ \eta = x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_t = e^{-x}u_\xi \\ u_x = -te^{-x}u_\xi + u_\eta \end{cases}$

$\rightarrow u_\eta = f(\eta)$. $u(\xi, \eta) = p(\xi) + \int_0^\eta f(s) ds$, $\boxed{u(x,t) = p(te^{-x}) + \int_0^x f(s) ds}$.

Del dato inicial: $u(x,1) = p(e^{-x}) + \int_0^x f = 0 \rightarrow p(v) = -\int_0^{-\ln v} f$, $\boxed{u(x,t) = \int_{x-\ln t}^x f(s) ds}$.

Solución única por no ser nunca la recta tangente a las características (o por ser $T=1$).

b] $\begin{cases} \hat{u}_t = -(1+k^2)\hat{u} \\ \hat{u}(k,0) = \hat{f}(k) \end{cases} \rightarrow \hat{u}(k,t) = p(k)e^{-t}e^{-k^2t} \xrightarrow{\text{c.i.}} p(k) = \hat{f}(k), \hat{u}(k,t) = e^{-t}\hat{f}(k)e^{-k^2t}$ (muy similar al calor).

Haciendo la convolución de las inversas: $\boxed{u(x,t) = \frac{e^{-t}}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(s)e^{-(x-s)^2/4t} ds}$.

Sustituyendo $f(s)$ y completando cuadrados se llegaría integrando a la solución elemental $(\bullet)$, pero mejor:

$\mathcal{F}(e^{-x^2/4}) = \sqrt{2}e^{-k^2}$, $\hat{u} = \sqrt{2}e^{-t}e^{-k^2(1+t)}$. Como $\mathcal{F}^{-1}(e^{-ak^2}) = \frac{1}{\sqrt{2a}}e^{-x^2/4a}$ es $\boxed{u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{1+t}}e^{-t}e^{-x^2/(4+4t)}}$.

$(\bullet) -\frac{s^2}{4} - \frac{s^2 - 2xs + x^2}{4t} = -\frac{1}{4} \left[\frac{s\sqrt{t+1}}{\sqrt{t}} - \frac{x}{\sqrt{t}\sqrt{t+1}} \right]^2 - \frac{x^2}{4(t+1)}$, cambio $v = [\dots]$

Soluciones de los problemas 5, 6, 7 y 8 de MII-C (entregados el 2-4-25).

- 5.** Sea (e) $x(x-1)y'' + 2y' - 2y = 0$. **a]** Hallar una solución no nula que se anule en $x=0$, escribiendo la regla de recurrencia. ¿Son analíticas todas sus soluciones en $x=0$? [Mejor calcular otra y_2 a partir de la y_1 hallada].
b] Probar que hay soluciones de (e) acotadas en $x=1$. ¿Tiene (e) soluciones polinómicas?
c] Determinar si hay soluciones de la ecuación (e) que tiendan a 0 cuando $x \rightarrow \infty$.

a] $x=0$ es singular regular con $r(r-1) - 2r + 0 = 0$, $r=3, 0$. Sólo se anula en $x=0$:

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{k+3} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} [(k+3)(k+2)c_k x^{k+3} - (k+3)(k+2)c_k x^{k+2} + 2(k+3)c_k x^{k+2} - 2c_k x^{k+3}]$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(k+4)(k+1)c_k x^{k+3} - (k+3)k c_k x^{k+2}] = 0 \rightarrow x^2: 0c_0 = 0, \forall c_0. \quad x^3: 4c_1 = 4c_0, \quad c_1 = c_0.$$

$$x^{k+2}: (k+3)k c_{k-1} - (k+3)k c_k = 0, \quad c_k = c_{k-1} \rightarrow c_3 = c_4 = \dots = c_0, \quad y_1 = x^3 [1 + x + x^2 + \dots] = \frac{x^3}{1-x}.$$

La $y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k + dy_1 \ln x$ será también analítica caso de ser $d=0$ (calculando se ve que lo es) y no lo será si $d \neq 0$.

Pero mejor hallamos $e^{\int [2/(x(1-x))] dx} = e^{\int [2/x + 2/(1-x)] dx} = \frac{x^2}{(1-x)^2} \rightarrow y_2 = y_1 \int \frac{x^2/(1-x)^2}{y_1^2} = \frac{x^3}{1-x} \int \frac{1}{x^4} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1-x}. \quad y_2 = \frac{1}{1-x}$

es analítica y todas lo serán en $x=0$. Y con la solución elemental las respuestas a **b]** y **c]** son fáciles:

Es claro que la y_2 hallada tiende a 0 en el infinito y no cuesta ver que la solución $y_2 - y_1 = \frac{1-x^3}{1-x} = 1 + x + x^2$ es un polinomio P (y obviamente acotado en $x=1$). Pero se pueden responder analizando ambos puntos:

b] Haciendo $s=x-1$ la ecuación se convierte en $s(1+s)y'' + 2y' - 2y = 0$, con $s=0$ regular, de $r=0, -1$.

$$y_1 = \sum_{k=0}^{\infty} c_k s^k \rightarrow \text{es obviamente acotada en } s=0, \text{ y calculando obtendremos } 1+s+\frac{1}{3}s^2 \text{ (es } P/3 \text{):}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} [k(k-1)c_k s^k + k(k-1)c_k s^{k-1}] + \sum_{k=1}^{\infty} 2k c_k s^{k-1} - \sum_{k=0}^{\infty} 2c_k s^k = 0 \rightarrow s^0: 2c_1 - 2c_0 = 0 \rightarrow c_1 = c_0;$$

$$s^1: 6c_2 - 2c_1 = 0 \rightarrow c_2 = \frac{1}{3}c_0; \quad s^2: 12c_3 - 0c_2 = 0 \rightarrow c_3 = 0 = c_4 = c_5 = \dots$$

c] $x = \frac{1}{s} \rightarrow \frac{1}{s}(1 - \frac{1}{s})[s^4 \ddot{y} + 2s^3 \dot{y}] + 2[-s^2 \dot{y}] - 2y = s^2(1-s)\dot{y} + s(2s-4)\dot{y} - 2y = 0$. $s=0$ singular regular, $r=1, -2$.

La y_1 tenderá a 0 al tender $s \rightarrow 0^+$ (es decir si $x \rightarrow \infty$).

- 6.** Sea $\begin{cases} y'' + 4y' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y'(1/2) = 0 \end{cases}$. **a]** Probar que $\lambda_0 = 4$ es autovalor y dar la $\{y_0\}$ asociada. Probar gráficamente que hay infinitos $\lambda_n > 4$ y escribir las $\{y_n\}$. [Ayuda: no existen $\lambda < 4$].
b] Con ayuda de ordenador dar un valor aproximado de λ_1 . O bien: **b*]** Probar sin ordenador que $\lambda_1 < 95$.
c] Hallar el primer término del desarrollo de $f(x) = e^{-2x}$ en serie de sus autofunciones (el coeficiente de y_0).
d] Precisar para qué valor de a tiene infinitas soluciones $y'' + 4y' + 4y = 8x - a$ con esos datos de contorno.

a] $\mu^2 + 4\mu + \lambda = 0$, $\mu = -2 \pm \sqrt{4 - \lambda}$. Si $\lambda = 4$ es $\mu = -2$ doble y si $\lambda > 4$ son $\mu = -2 \pm wi$, con $w = \sqrt{\lambda - 4}$.

$\lambda = 4$: $y = [c_1 + c_2 x] e^{-2x}$, $y' = [c_2 - 2c_1 - 2c_2 x] e^{-2x} \rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ -2e^{-1} c_1 = 0 \end{cases} \rightarrow \lambda_0 = 4$ autovalor, $y_0 = \{x e^{-2x}\}$.

$\lambda > 4$: $y = [c_1 \cos(wx) + c_2 \sin(wx)] e^{-2x}$, $y(0) = c_1 = 0$. Y del otro dato:

$y'(1/2) = c_2 e^{-1} [w \cos \frac{w}{2} - 2 \sin \frac{w}{2}] = 0$. c_2 cualquiera si $\frac{w}{2} = \tan \frac{w}{2}$.

Son los infinitos $\lambda_n = 4 + w_n^2$, con $y_n = \{e^{-2x} \sin(w_n x)\}$, $n = 1, 2, \dots$

[Para $\lambda < 4$ se obtiene que habría autovalores si fuese $\text{th} \frac{w}{2} = \frac{w}{2}$ y eso nunca ocurre].

b] El primer corte entre la tangente y la recta es en $w_1 \approx 8.987 \rightarrow \lambda_1 \approx 84.763$.

b*] Gráficamente: $w_1 < 3\pi < 3(3.15) = 9.45 < \frac{19}{2} \rightarrow 4 + w_1^2 < 4 + \frac{361}{4} < 95$.

c] Para $e^{-2x} = c_0 x e^{-2x} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-2x} \sin(w_n x)$ es $c_0 = \frac{\langle e^{-2x}, y_0 \rangle}{\langle y_0, y_0 \rangle} = \frac{\int_0^{1/2} x dx}{\int_0^{1/2} x^2 dx} = \frac{1/8}{1/24} = 3$, pues el peso es

$r(x) = e^{4x}$, ya que nuestra EDO pasa a ser $[e^{4x} y']' + \lambda e^{4x} y = 0$ en forma autoadjunta.

[Calculando y simplificando los c_n no pedidos se llega a la expresión $c_n = \frac{4}{w_n [1 + \cos(w_n/2)]}$, y con los valores aproximados hasta w_5 se obtiene este dibujo sumando 4 y 6 términos].

d] En forma autoadjunta: $[e^{4x} y']' + \lambda e^{4x} y = e^{4x} (8x - a)$. El homogéneo tiene infinitas soluciones $\{x e^{-2x}\}$.

Debe ser: $0 = \int_0^{1/2} e^{2x} (8x^2 - ax) dx = (4x^2 - \frac{ax}{2}) e^{2x} \Big|_0^{1/2} - \int_0^{1/2} (8x - \frac{a}{2}) e^{2x} dx = \dots = e^{-2} - \frac{a}{4} \rightarrow a = 4e - 8$.

Directamente es largo. La solución general de la no homogénea acaba siendo: $y = [c_1 + c_2 x] e^{2x} + 2x - 2 - \frac{a}{4}$.

De $y(0) = 0$ se obtiene $c_1 = 2 + \frac{a}{4}$ y del otro sale $c_1 = e$. Sólo es posible para el a de antes, quedando c_2 libre.

- 7. a)** Calcular 6 términos no nulos de la serie de Fourier de $f(x) = \begin{cases} \pi/2, & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ 0, & \pi/2 < x \leq \pi \end{cases}$ en $\{\cos nx\}$. Dibujar la f junto a la suma de esos términos [con ordenador]. ¿Cuál debe ser la suma de la serie si: i) $x=0$, ii) $x=\pi/2$?
- b)** Resolver $\begin{cases} u_t - u_{xx} + u = 0, & x \in (0, \pi), t > 0 \\ u(x, 0) = f(x), & u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0 \end{cases}$ para: i) $f(x) = \cos x$, ii) la $f(x)$ del **a**].

a) Si $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ es $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx$ para $n=0, 1, 2, \dots$
 En concreto, $a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \pi/2 dx = \frac{\pi}{2}$. $a_n = \int_0^{\pi/2} \cos nx dx = \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n}$, $n > 1$.
 Sólo sobreviven la constante y los cosenos impares:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \frac{1}{7} \cos 7x + \frac{1}{9} \cos 9x - \dots$$

i) Como la extensión par de f es continua en 0 la suma debe ser su valor en el punto $f(0) = \frac{\pi}{2}$. [Comprobable: es $\pi/4$ más el arctan 1].

ii) En $\frac{\pi}{2}$ (es discontinua) convergerá hacia $\frac{1}{2}[f(\frac{\pi}{2}^-) + f(\frac{\pi}{2}^+)] = \frac{\pi}{4}$. [Esto es obvio en la serie].

b) $u = XT$, $\frac{T'}{T} + 1 = \frac{X''}{X} = -\lambda \rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X'(0) = X'(\pi) = 0 \end{cases}$, $\lambda_n = n^2$, $n=0, 1, 2, \dots$. $X_n = \{\cos nx\}$. (Entre ellos $X_0 = \{1\}$).
 Y además $T' = -(\lambda+1)T$, $T_n = \{e^{-(n^2+1)t}\}$.

Por tanto $u(x, t) = \frac{a_0}{2} e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-(n^2+1)t} \cos nx$ y sólo falta cumplirse $u(x, 0) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx = f(x)$.

Para i) (no se necesita hacer ninguna integral) es claramente $a_1 = 1$ y resto $a_n = 0 \rightarrow u(x, t) = e^{-2t} \cos x$.

Para ii) los a_n son los calculados en **a**], y así es:

$$u(x, t) = \frac{\pi}{4} e^{-t} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}}{2m-1} e^{-(4m^2-4m+2)t} \cos(2m-1)x$$

$$= \frac{\pi}{4} e^{-t} + e^{-2t} \cos x - \frac{1}{3} e^{-10t} \cos 3x + \frac{1}{5} e^{-26t} \cos 5x + \dots$$

A la derecha solución dibujada para $t = 0, 0.05, 0.4, 1$ con 6 términos de la serie. Tiende a 0 cuando $t \rightarrow \infty$ por el término $+u$ a pesar de sus extremos aislados.

- 8.** Resolver este problema no homogéneo para una cuerda con rozamiento y comprobar su solución: $\begin{cases} u_{tt} + 2u_t - 2u_{xx} = e^{-t} \sin x, & x \in [0, \pi], t \in \mathbf{R} \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 7 \sin 5x, & u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \end{cases}$

Separando variables en la ecuación homogénea: $u = XT \rightarrow X(T'' + 2T') = 2X''T$, $\frac{X''}{X} = \frac{T'' + 2T'}{2T} = -\lambda$.

$\rightarrow \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(\pi) = 0 \end{cases} \rightarrow X_n = \{\sin nx\}$, $n=1, 2, \dots$ [y además $T'' + 2T' + 2\lambda T_n = 0$ que aquí no se usa].

Se lleva pues a la EDP: $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx$, obteniendo $\sum_{n=1}^{\infty} [T_n'' + 2T_n' + 2n^2 T_n] \sin nx = e^{-t} \sin x$.
 ya desarrollada

Además: $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin nx = 0$, $u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0) \sin nx = 7 \sin 5x \Rightarrow T_n(0) = T_n'(0) = 0$,
 menos $T_5'(0) = 7$.

Todas las EDOs son homogéneas con coeficientes continuos y datos iniciales nulos (y podemos asegurar que su solución es $T_n \equiv 0$ sin calcular nada, pues 0 es solución y sabemos que hay solución única) menos dos:

$$\begin{cases} T_1'' + 2T_1' + 2T_1 = e^{-t} \\ T_3(0) = T_3'(0) = 0 \end{cases}, T_1 = (c_1 \cos t + c_2 \sin t) e^{-t} + e^{-t} \quad [\mu = -1 \pm i, T_{1p} = Ae^{-t} \rightarrow A = 1] \xrightarrow{d.i.} u_1 = [1 - \cos t] e^{-t}$$

$$\begin{cases} T_5'' + 2T_5' + 50T_5 = 0 \\ T_5(0) = 0, T_5'(0) = 7 \end{cases}, T_5 = (c_1 \cos 7t + c_2 \sin 7t) e^{-t} \quad [\mu = -1 \pm 7i] \xrightarrow{d.i.} u_5 = e^{-t} \sin 7t$$

La solución será entonces: $u(x, t) = [1 - \cos t] e^{-t} \sin x + e^{-t} \sin 7t \sin 5x$.

$u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ por cumplirlo $\sin x$ y $\sin 5x$. $u(x, 0) = 0$ por anularse el $[\cdot]$ y $\sin 7t$.

$$u_t = [\sin t + \cos t - 1] e^{-t} \sin x + [7 \cos 7t - \sin 7t] e^{-t} \sin 5x \xrightarrow{t=0} 7 \sin 5x$$

$$u_{tt} = [1 - 2 \sin t] e^{-t} \sin x + [-14 \cos 7t - 48 \sin 7t] e^{-t} \sin 5x$$

$$u_{xx} = -[1 - \cos t] e^{-t} \sin x - 25 e^{-t} \sin 7t \sin 5x$$

$$u_{tt} + 2u_t - 2u_{xx} = [(1 - 2 + 2) + (2 - 2) \cos t + (-2 + 2) \sin t] e^{-t} \sin x + [(-14 + 14) \cos 7t + (-48 - 2 + 50) \sin 7t] e^{-t} \sin 5x = e^{-t} \sin x$$

[Si se ha encontrado una solución de la EDP que además cumple los datos de contorno: $v = e^{-t} \sin x$, hacer $w = u - v$ llevaría el problema a uno homogéneo, a cambio de complicar los datos iniciales].